

Rapport de surveillance de la grippe - 2011-2012

Mise à jour sur la situation et les enjeux

Le 20 janvier 2012

Activité grippale dans la région de Middlesex-London :

Depuis le dernier rapport, on a signalé un cas de grippe humaine A (H3) et le premier cas de grippe B au Bureau de santé de Middlesex-London. Dans la région de Middlesex-London, depuis le début de la période de surveillance de l'activité grippale 2011-2012, on a signalé sept cas de grippe A, dont cinq étaient des cas de grippe humaine A (H3), et un cas de grippe B. Aucune éclosion de grippe n'a été signalée dans une maison de soins de longue durée ou un établissement de soins actifs. Le pourcentage global de patients des services des urgences et du centre de soins d'urgence mineure qui avaient une maladie fébrile était plus faible que la semaine précédente et le taux d'absentéisme scolaire était faible. Selon les renseignements disponibles, l'activité grippale demeure faible dans la région de Middlesex-London.

Activité grippale à l'échelle provinciale et nationale :

Grippe : L'activité grippale en Ontario continue à augmenter, mais elle demeure plus faible que par les années passées. Selon le plus récent Ontario Influenza Bulletin, on a signalé 33 cas de grippe entre le 8 et le 14 janvier 2012. En tout, 111 cas de grippe ont été signalés aux autorités provinciales pour la période de surveillance 2011-2012. La plupart des cas de grippe signalés étaient des cas de grippe A (H1N1)pdm09 (anciennement appelée A pH1N1) (29 cas) ou des cas de grippe B (42 cas), qui représentent ensemble 64 % (71/111) des cas signalés jusqu'ici. À l'échelle nationale, l'activité grippale est à la hausse à plusieurs endroits, mais elle demeure faible dans les territoires, dans le nord de l'Ontario et du Québec et dans la région de l'Atlantique.

Jusqu'à présent, la caractérisation des souches du virus grippal à partir des isolats soumis aux laboratoires ontariens et canadiens a révélé un bon degré de similitude avec les souches présentes dans le vaccin antigrippal de cette année. La caractérisation de 89 échantillons d'un peu partout au Canada effectuée depuis le début de la saison par le Laboratoire national de microbiologie a donné les résultats suivants : 35 souches analogues à A/Perth/16/2009 (H3N2) et 19 souches analogues à A/California/07/2009, deux composantes du vaccin de 2011-2012; 14 souches analogues à B/Brisbane/60/2008, souche également présente dans le vaccin de cette année; et 21 souches analogues à B/Wisconsin/01/2010, mais d'une lignée différente de celle présente dans la formulation vaccinale de cette année.

Virus respiratoire syncytial : À l'échelle provinciale, le virus le plus courant est le virus respiratoire syncytial (VRS). Parmi les 172 échantillons analysés par les laboratoires provinciaux de santé publique, 64 ont révélé la présence du VRS, soit un taux de positivité de 37 %.

Taux de vaccination contre la grippe :

Le Bureau de santé a recueilli des renseignements sur le taux de vaccination contre la grippe des pensionnaires et du personnel des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et des hôpitaux de soins actifs. Ces renseignements reflètent les taux enregistrés jusqu'au 15 novembre 2011 inclusivement. En tout, 28 des 41 établissements considérés comme des foyers de longue durée ou des maisons de retraite et les 6 établissements considérés comme des hôpitaux ont signalé leur taux de vaccination au Bureau de santé.

À Middlesex-London, le taux de vaccination des pensionnaires des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite allait de 75 % à 100 %, la moyenne s'établissant à 92 %.

Le taux de vaccination du personnel des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite allait de 7 % à 100 %, selon l'établissement. La moyenne s'établissait à 55 %, comparativement à 52 % l'an dernier.

Le taux de vaccination du personnel des six établissements considérés comme des hôpitaux allait de 31 % à 61 %. La moyenne s'établissait à 42 %, comparativement à 35 % l'an dernier.

Il est fortement recommandé que les fournisseurs de soins de santé qui n'ont pas encore été vaccinés contre la grippe le soient. Cela contribuera à prévenir la transmission aux autres par le personnel qui s'occupe de patients hospitalisés atteints de la grippe.

Possibilités de recevoir le vaccin contre la grippe :

Il est encore possible de se faire vacciner contre la grippe aux cabinets de certains fournisseurs de soins ainsi qu'aux séances de vaccination sans rendez-vous du Bureau de santé. Les séances au 50, rue King, à London ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 16 h ainsi que le premier et troisième mercredi de chaque mois de 9 h à 19 h. Au Kenwick Mall, à Strathroy, les séances ont lieu de 15 h 30 à 19 h 30 le premier mardi du mois.

Annexe A
Sommaire des indicateurs pour la surveillance de la grippe dans la communauté

L'activité grippale dans la région de Middlesex-London demeure faible.

Indicateur	Données et tendances récentes	Commentaires
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	À la baisse	<p>Entre le 8 et le 14 janvier, 4,8 % en moyenne des patients des services des urgences du London Health Sciences Centre (LHSC) et du Centre de soins d'urgence mineure du St. Joseph's Health Centre (SJHC) avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires, ce qui est inférieur au 7,2 % enregistré la semaine précédente.</p> <p>Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques : 13,5 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires, ce qui représente une baisse par rapport au 19,9 % enregistré la semaine précédente.</p>
Signalement de l'absentéisme dans les écoles (p. ex. absentéisme > 10 %)	Nombre peu élevé	Entre le 9 et le 13 janvier 2012, aucune des écoles élémentaires des deux conseils scolaires de langue anglaise n'a signalé un taux d'absentéisme moyen sur 5 jours supérieur à 10 %.
Cas confirmés en laboratoire	Semblable	<p>Depuis le dernier rapport, on a signalé au Bureau de santé un nouveau cas de grippe humaine A (H3) et un nouveau cas de grippe B.</p> <p>Depuis le début de la période de surveillance de l'activité grippale, on a signalé au Bureau de santé de Middlesex-London 7 cas de grippe A, dont 5 étaient des cas de grippe humaine A (H3), et un cas de grippe B.</p>
Hospitalisations	Semblable	<p>Depuis le dernier rapport, aucun nouveau cas de grippe confirmé en laboratoire n'a entraîné d'hospitalisation.</p> <p>Depuis le début de la période de surveillance de l'activité grippale, cinq personnes atteintes de grippe confirmée en laboratoire ont été hospitalisées.</p>
Décès	Aucun signalement	
Éclosions dans les établissements de soins de longue durée	Aucun signalement	Depuis le début de la période de surveillance de l'activité grippale, aucune éclosion de grippe en établissement n'a été signalée au Bureau de santé.
Nouveaux cas de bronchopneumonie signalés par un fournisseur de radiographies sentinelle	Semblable	Du 9 au 14 janvier, 2,9 % des radiographies des poumons réalisées par le fournisseur de radiographies sentinelle étaient des nouveaux cas de bronchopneumonie, ce qui est comparable au taux de 2,5 % observé la semaine précédente.
Volume d'appels à Télésanté Ontario pour des questions sur les maladies respiratoires ou grippales	Aucun signalement	
Pourcentage d'échantillons envoyés pour analyse qui sont positifs	Nombre peu élevé, mais légèrement plus élevé que la semaine précédente	Selon les analyses effectuées du 8 et le 14 janvier 2012 par les laboratoires provinciaux de santé publique, 8 des 426 échantillons analysés ont révélé la présence du virus de la grippe A, soit un taux de positivité de 1,9 %, et 9 des 422 échantillons analysés ont révélé la présence de la grippe B, soit un taux de positivité de 2,1 %.



communicable disease & sexual health • dental health • environmental health & chronic disease prevention • family health • research, education, evaluation & development